

УДК 595.768.1

## ОБЗОР ВИДОВ РОДА *DEPORAUS* (COLEOPTERA, RHYNCHITIDAE) ФАУНЫ РОССИИ. 2. ПОДРОДЫ *ROELOFSIDEPORAUS* И *DEPORAUS*

© 2009 г. А. А. Легалов

Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН,  
Новосибирск 630091, Россия

e-mail: legalov@ngs.ru

Поступила в редакцию 16.07.2008 г.

Ревизованы подроды *Roelofsideporaus* и *Deporaus* s. str. фауны России. Составлены определительные таблицы видов подрода *Roelofsideporaus* и самок подродов *Roelofsideporaus* и *Deporaus* s. str. Выявлено распространение этих видов в России.

Подрод *Roelofsideporaus* Legalov 2003  
(рис. 1а–1г, 1ж, 1з; 2а, 2б, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2к–2н)

*Deporaus* subgenus *Roelofsideporaus* Legalov 2003: 174.

Типовой вид *Deporaus affectatus* Faust 1887, по первоначальному обозначению.

О пис а н и е. Тело черное, блестящее, покрытое полуторчащими, короткими, светлыми волосками. Длина тела 2.3–3.5 мм. Головотрубка короткая и почти прямая у самцов, слабо равномерно изогнутая или слабо угловидно изогнутая в месте прикрепления усиков у самок, расширенная к вершине, от места прикрепления усиков до основания с килем. Усики прикреплены на середине у самцов и перед серединой головотрубки у самок. Глаза крупные, довольно сильно выпуклые, у самок мельче и слабее выпуклые. Лоб широкий, почти плоский, пунктированный, с бороздкой. Виски удлиненные. Темя выпуклое, мелко и густо пунктированное. Шейная перетяжка явственная. Усики средних размеров, заходят за середину переднеспинки. Булава довольно широкая, короче жгутика, не компактная. Переднеспинка слабо поперечная, слабо сужающаяся к основанию и вершине, с пронотальной перетяжкой. Бока почти прямые или слабо закругленные. Наибольшая ширина в первой трети или перед основанием переднеспинки. Диск густо и мелко пунктированный. Надкрылья почти прямоугольные. Наибольшая ширина за серединой. Плечи слабо сглаженные. Промежутки выпуклые, с рядом точек. Бороздки явственные и довольно широкие. Точки в них крупные и глубокие. 9-я бороздка сливается с 10-й бороздкой в вершинной части надкрылий. Грудь и эпистерны густо пунктированные. Брюшко выпуклое, 1–4-й вентриты довольно широкие. 1-й вентрит уже 2-го вентрита. 2-й вентрит шире 3-го вентрита. 4-й вентрит чуть уже 3-го вентрита. 5-й вентрит узкий, значительно уже 4-го вентрита. Пигидий и пропигидий густо пунктированные. Ноги средних размеров. Бедра утолщенные.

Голени длинные. Передние голени почти прямые, более узкие у самцов, иногда с мукро. Средние и задние голени более широкие, уплощенные, расширенные к вершине. Лапки длинные. 1-й членик обычно сильно удлиненный, особенно на средних и задних лапках. 2-й членик треугольный. 3-й членик двухлопастный. Коготковый членик удлиненный. Коготки с зубцами.

З а м е ч а н и я. Подрод *Roelofsideporaus* образуют 3 вида: *D. (R.) affectatus* Faust 1887, *D. (R.) nidi-ficus* Sawada et Lee 1986 и *D. (R.) unicolor* (Roelofs 1874).

*Deporaus (Roelofsideporaus) affectatus* Faust 1887  
(рис. 1а, 1б, 1ж; 2а, 2г, 2ж, 2к–2м)

*Deporaus affectatus* Faust 1887: 163; *Rhynchites affectatus*: Heyden, 1893: 173; *Deporaus affectatus*: Voss, 1939: 111; *D. affectatus*: Voss, 1942: 136; *D. affectatus*: Voss, 1952: 23; *Depasophilus proximus*: Азарова, 1974: 787; *Deporaus unicolor*: Азарова, 1974: 788; *Depasophilus proximus*: Азарова, 1981: 40; *Deporaus affectatus*: Егоров, 1996: 214; *D. affectatus*: Легалов, 2002: 109; *D. affectatus*: Легалов, 2003: 174; *D. affectatus*: Легалов, 2005: 49; *D. affectatus*: Легалов, 2006: 202; *D. affectatus*: Legalov, Shevniin, 2007: 10; *D. affectatus*: Legalov, Shevniin, 2007a: 3; *D. affectatus*: Legalov, 2007: 97.

М а т е р и а л. Россия: лектотип 1 ♀ и паралектотип 1 ♀, “коричневый квадратик”, “Nikolajefsk, Koltz”, “Coll. J. Faust, Ankauf 1900”, “Staatl. Museum für Tierkunde, Dresden”, “Type”, “*affectatus* Faust”, “Lectotype *Deporaus affectatus* Fst., A. Legalov design. 2005” (SMTD); Япония: паралектотип 1 ♂, “коричневый квадратик”, “Japonia, Kraatz”, “Coll. J. Faust, Ankauf 1900”, “Staatl. Museum für Tierkunde, Dresden”, “Type”, “*affectatus* Faust”, “Paralectotype *Deporaus affectatus* Fst., A. Legalov design. 2005” (SMTD); Россия: Читинская обл.: 1 (ЗИН); Амурская обл.: 1 (ЗИН); Хабаровский край: 3 (СЗМН, ЗИН, DEI); Приморский край: 46 (БПИ, СЗМН, ЗИН, DEI, RDP); Сахалин: 13