

## Кормовые преференции имаго мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) в условиях Южного Зауралья

### Trophic preferences of hover-fly adults (Diptera, Syrphidae) in Southern Trans-Urals

Б.С. Сорокина  
V.S. Sorokina

Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091  
Россия. E-mail: sorokinav@mail.ru.

Siberian Zoological Museum, Institute of Systematic and Ecology of Animals, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Frunze  
str. 11, Novosibirsk 630091 Russia.

**Ключевые слова:** мухи-журчалки, Syrphidae, Южное Зауралье, трофические преференции.

**Key words:** hover-flies, Syrphidae, Southern Trans-Urals, trophic preferences.

**Резюме.** В качестве источника питания сирфид в условиях Южного Зауралья отмечено 120 видов 92 родов из 29 семейств растений. Изучены взаимоотношения с цветковыми растениями у 169 видов из 48 родов мух-журчалок. Все виды журчалок посещали растения класса двудольных и лишь 37 видов из 20 родов — класса однодольных. Семейства растений в порядке убывания предпочтения расположились в следующем порядке: Rosaceae, Apiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Brassicaceae, Salicaceae и Alismataceae. На видовом уровне наиболее привлекательными оказались *Taraxacum officinale* (Asteraceae), *Euphorbia virgata* (Euphorbiaceae), *Spiraea crenata* (Rosaceae), *Heracleum sibiricum* (Apiaceae), *Caltha palustris* (Ranunculaceae) и *Cenolophium denudatum* (Apiaceae). It is noted that 118 species of hover-flies are polyphagous, 12 species are oligophagous, and 39 species are found on only plant species. The reasons for different Syrphidae preferring/visiting particular plant species is analysed.

### Введение

Мухи-сирфиды активно посещают цветки различных растений, питаясь их пыльцой и нектаром [Гринфельд, 1955; 1962], однако, степень активности посещения тех или иных растений различна. Это отмечено в ряде работ, посвященных экологии журчалок, хотя во многих из них приводятся лишь сводки по кормовым растениям имаго сирфид [Багачанова, 1990; Holloway, 1976; Keilbach, 1954; Leereveld et al., 1976; Malec, 1986; Radisic et al., 1999, 2001a, 2001b; Reemer, 1999; Stelleman, Meeuse, 1976]. Антофильные комплексы некоторых растений изучали Мутин [1983а, 1983б, 1987а, 1987б] и Грицкевич [1998]. Интересным оказался вопрос: отдают ли предпочтение мухи-журчалки тем или иным таксонам растений или посещение последних случайно? В случае положительного ответа возникает следующий вопрос: какие причины этому способствуют? Хэслетт [Haslett, 1989] пытался связать пищевые предпочтения с цветом посещаемых журчалками цветков, Ссиманк [Ssymank, 2001; 2002a; 2002b] также связывал посещение сирфидами растений с цветом и формой их цветков. Предпочтение журчалками тех или иных видов растений объясняют и различиями в строении ротового аппарата мух [Gilbert, 1981, 1985; Мутин, 1985]. Все эти работы были выполнены на основании рассмотрения содержимого кишечника журчалок и наличия там пыльцы. Длусский и Лаврова [2001] провели количественный анализ пыльцы разных видов растений, обнаруженной в кишечнике сирфид, откуда

**Abstract.** 120 species of plants belonging to 92 genera of 29 families are marked as a food resource for the hover-flies in Southern Trans-Urals. The mutual relationships between 169 species of 48 genera of Syrphidae and flowering plants are investigated. Feeding of all hover-fly species on the Magnoliopsidae and 37 species on the Liliopsidae is recorded. The range of most popular plant families for flies in order of preference is as follows: Rosaceae, Apiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Brassicaceae, Salicaceae and Alismataceae; and the most popular plant species as follows: *Taraxacum officinale* (Asteraceae), *Euphorbia virgata*

сделали выводы о различиях в питании мух, причём степень различий и таксономической близости видов не коррелировали между собой. Грицкевич, изучив антофильные комплексы 18 широко распространённых в Нижнем Приамурье растений, указал, что на степень различия этих комплексов влияют временной фактор (срок цветения растения) и пространственный (тип ландшафта). Кроме того, он объяснил сходство в антофильных комплексах среди растений сходным строением их соцветий [Грицкевич, 1998]. В работе Баркалова и Бурлака [2000], посвящённой взаимоотношениям мух-журчалок рода *Cheilosia* Mg. и цветковых растений, обсуждаются такие причины различий пищевых предпочтений у разных видов мух, как совпадение сроков лёта хейлозий и цветения растений, таксономическое сходство видов растений, сходство биотопического распределения растений и мест выплода мух, несовпадение размеров ареалов у хейлозий и растений, привлекательность цветков и ряд других. В этой работе проводится предварительный качественный анализ данных по кормовым растениям хейлозий, без количественного учёта посещаемости кормовых растений, хотя они необходимы для выявления истинной картины предпочтения сирфидами тех или иных видов растений.

Целью нашей работы явилось изучение кормовых связей мух-журчалок с цветковыми растениями и сопоставление полученных данных с имеющимися сведениями о причинах предпочтения журчалками определённых растений. Для этого проанализированы спектр посещаемых сирфидами растений и данные количественных учётов журчалок на наиболее посещаемых видах растений. В анализе использовались оригинальные материалы для всех видов сирфид, обитающих на территории Южного Зауралья, что позволяет произвести сравнение полученных результатов с данными кормовых преференций мух рода *Cheilosia* Mg. Палеарктики [Баркалов, Бурлак, 2000].

## Материал и методы

В основу работы легли сборы автора в период с 1998 по 2002 год на территории Южного Зауралья. Этот регион находится на юго-западе Западно-Сибирской равнины. Большую часть этого региона занимает Курганская область. В рамках Южного Зауралья нами включены также южная часть Тюменской области, юго-восток Свердловской области, граничащие с Курганской областью на севере, и восточная часть Челябинской области на западной её границе.

При сборе кормовых растений учитывались только те, нектаром и пыльцой которых непосредственно питались мухи. Все растения определены д.б.н. Н.И. Науменко (Курганский государственный университет). Объём и названия таксонов растений согласованы с монографией С.К. Черепанова [1995].

Для количественных учётов выбирались площадки с обильно цветущими растениями, и проводился сбор мух сачком с цветков каждого вида растений в течение 10 минут каждого часа. Всего за период исследований проведено 40 суточных учётов (с 7 до 21 часа). Помимо этих учётов насекомых собирали не-

посредственно с цветков один раз в день в течение 10 минут на протяжении всего периода цветения конкретного вида растения. Учёт проводили в часы максимальной активности мух-журчалок.

Для оценки качественного сходства разных таксонов растений и сирфид использовался коэффициент Шимкевича–Симпсона [Песенко, 1972, 1982]. Для оценки количественных характеристик растений по посещаемости их журчалками применён коэффициент Чекановского–Съеренсена. Обилие выражено в относительной доле численности, которое рассчитывалось делением общего числа особей на количество учётов. Обработка материала осуществлялась в программе «STATISTICA». При построении дендрограмм использовался метод объединения незвешенных парных групп по средним величинам (Unweighted pair-group average). На группы объекты кластеризовались методом K-средних (K-means clustering).

## Результаты

### ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙСТВ РАСТЕНИЙ, ПОСЕЩАЕМЫХ СИРФИДАМИ

За период исследования изучены взаимоотношения с цветковыми растениями для 169 видов 48 родов мух-журчалок. По сводке Н.И. Науменко и Д.В. Суханова [1999], в Курганской области происходит 1149 видов из 420 родов и 98 семейств цветковых растений. Из них 120 видов 92 родов из 29 семейств были отмечены в качестве источников питания мух-журчалок (табл. 5). Продолжение исследований в этой области существенно дополнит список растений в кормовой базе сирфид. Рассматриваемые растения относятся к обоим классам цветковых растений — двудольным (*Magnoliopsidae*) и к однодольным (*Liliopsidae*) (рис. 1). Однодольные составили всего 10 видов из 6 семейств, на которых было зарегистрировано 37 видов (22%) журчалок из 20 родов (42%). Все анализируемые виды мух посещали цветки растений класса двудольных (110 видов 23 семейств).

Подавляющее большинство мух-журчалок было зарегистрировано на растениях подкласса Rosidae (рис. 1) — 135 видов (80%) из 46 родов (96%), в который вошли 40 видов анализируемых растений. Второе место по содержанию видов растений (30) и по количеству посетивших их видов журчалок — 89 видов (53%) из 28 родов (58%) занял подкласс Asteridae. Подкласс Dilleniidae содержит почти в два раза меньше видов растений (17), чем предыдущий подкласс, однако по количеству видов мух-журчалок, отмеченных на этих растениях, он немногим ему уступает (85 или 50%), а по количеству посещаемых родов насекомых даже превосходит (32 или 67%).

Из всех 29 семейств растений наиболее предпочтаемыми для мух-журчалок оказались, в порядке убывания, следующие: Rosaceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Brassicaceae, Salicaceae и Alismataceae (рис. 2). На этих семействах были зарегистрированы все виды журчалок.

Количество посещаемых сирфидами видов растений этих семейств, количество и процентная доля от




Рис. 1. Посещаемые сирфидами растения на уровне классов, подклассов и семейств. Число под названием — число видов растений; дробь над названием — количество таксонов мух: числитель — количество родов, знаменатель — количество видов. Сокращения: Typha — Typhaceae, Alism — Alismataceae, Butom — Butomaceae, Aliac — Alliaceae, Cyper — Cyperaceae, Poace — Poaceae, Salic — Salicaceae, Caryo — Caryophyllaceae, Ranun — Ranunculaceae, Brassic — Brassicaceae, Gross — Grossulariaceae, Rosac — Rosaceae, Geran — Geraniaceae, Eupho — Euphorbiaceae, Tilia — Tiliaceae, Lythr — Lythraceae, Onagr — Onagraceae, Apiac — Apiaceae, Primu — Primulaceae, Limon — Limoniaceae, Oleac — Oleaceae, Convo — Convolvulaceae, Borag — Boraginaceae, Lamiac — Lamiaceae, Scroph — Scrophulariaceae, Plant — Plantaginaceae, Rubiac — Rubiaceae, Caprif — Caprifoliaceae, Aster — Asteraceae.

Fig. 1. Classes, subclasses and families of plants visited by hover-flies. The figure beneath the title is the number of plant species and the fraction above the title is the associated number of hover-fly taxa. Abbreviations used: Typha — Typhaceae, Alism — Alismataceae, Butom — Butomaceae, Aliac — Alliaceae, Cyper — Cyperaceae, Poace — Poaceae, Salic — Salicaceae, Caryo — Caryophyllaceae, Ranun — Ranunculaceae, Brassic — Brassicaceae, Gross — Grossulariaceae, Rosac — Rosaceae, Geran — Geraniaceae, Eupho — Euphorbiaceae, Tilia — Tiliaceae, Lythr — Lythraceae, Onagr — Onagraceae, Apiac — Apiaceae, Primu — Primulaceae, Limon — Limoniaceae, Oleac — Oleaceae, Convo — Convolvulaceae, Borag — Boraginaceae, Lamiac — Lamiaceae, Scroph — Scrophulariaceae, Plant — Plantaginaceae, Rubiac — Rubiaceae, Caprif — Caprifoliaceae, Aster — Asteraceae.

общего списка фауны видов и родов сирфид, посещавших указанные семейства растений, приводится в таблице 1.

#### КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СХОДСТВА РАСТЕНИЙ НА УРОВНЕ СЕМЕЙСТВ, РОДОВ И ВИДОВ

Кластеризация восьми наиболее предпочтаемых сирфидами семейств по посещавшим их видам мух показала отличие Salicaceae от всех семейств (рис. 3). Это подтверждает своеобразие энтомофильного комплекса Salicaceae, которое, скорее всего, связано с ранним цветением разных видов ив (конец апреля – май). На ивовых доминировали муhi рода *Cheilosia*, причём *Ch. grossa* зарегистрирован только на представителях этого семейства. В кормовом спектре *Melangyna barbifrons* известны также только ивовые. Такие виды, как *Melangyna triangulifera* и *Cheilosia angustigena*, посещали, кроме этого семейства, цветки розоцветных (Rosaceae), *Melangyna lasiophtalma* — цветки лютиковых. На ивовых не были отмечены муhi рода *Eristalis*.

Цветение большинства видов остальных семейств растений приходится на июнь – сентябрь. По сходству




Рис. 2. Качественная характеристика семейств растений, посещаемых сирфидами. Принятые сокращения: Rosa — Rosaceae, Apiac — Apiaceae, Aster — Asteraceae, Ranun — Ranunculaceae, Euph — Euphorbiaceae, Salic — Salicaceae, Bras — Brassicaceae, Alism — Aliamataceae.

Fig. 2. Characteristics of plant families visited by hover-flies. Abbreviations used: Rosa — Rosaceae, Apiac — Apiaceae, Aster — Asteraceae, Ranun — Ranunculaceae, Euph — Euphorbiaceae, Salic — Salicaceae, Bras — Brassicaceae, Alism — Aliamataceae.

Таблица 1. Преобладающие роды сирфид на растениях разных семейств Южного Зауралья.

Table 1. Abundance of hover-fly genera on the different plant families in Southern Trans-Urals.

Род сирфид	Общее количество видов мух в роде	Семейство растений (для каждого приводится количество отмеченных видов журчалок)							
		Rosaceae	Apiaceae	Asteraceae	Ranunculaeae	Euphorbiaceae	Salicaceae	Brassicaceae	Alismataceae
<i>Cheilosia</i> Mg.	<b>34</b>	17	14	19	15	8	12	1	1
<i>Eristalis</i> Latr.	<b>16</b>	11	9	11	10	8	-	8	5
<i>Eupeodes</i> O.-S.	<b>8</b>	7	6	7	2	3	3	3	1
<i>Dasyphorus</i> End.	<b>6</b>	5	2	5	3	1	2	3	-
<i>Mallota</i> Mg.	<b>3</b>	3	1	-	-	3	-	1	-
<i>Tenostoma</i> Pel. et Ser.	<b>3</b>	3	-	-	-	-	-	-	-
<i>Parhelophilus</i> Gir.	<b>3</b>	3	2	2	-	2	-	3	2
<i>Helophilus</i> Mg.	<b>3</b>	3	3	3	3	2	1	3	3
<i>Anasimyia</i> Schin	<b>3</b>	3	-	3	3	3	2	2	3
<i>Melangyna</i> Verr.	<b>9</b>	2	5	-	1	-	3	-	-
<i>Syrphus</i> F.	<b>4</b>	3	4	3	2	3	2	3	1
<i>Scaeva</i> F.	<b>2</b>	-	2	1	-	-	-	-	-
<i>Volucella</i> Geof.	<b>3</b>	2	2	3	-	2	-	-	-
<i>Chrysotoxum</i> Mg.	<b>8</b>	4	4	3	3	5	-	1	-
<i>Platycheirus</i> Lep. et Serv.	<b>10</b>	1	3	4	2	-	3	-	5
<i>Orthonevra</i> Macq.	<b>6</b>	1	-	-	5	1	1	-	-
<i>Neoascia</i> Will.	<b>4</b>	3	2	2	4	-	1	1	3
Видов растений, посещаемых журчалками		20	14	28	9	2	7	6	1
Видов журчалок, отмеченных на растениях семейства (процент от всех видов фауны)		103 (61)	91 (54)	89 (53)	62 (37)	58 (34)	38 (22)	38 (22)	32 (19)
Родов журчалок, отмеченных на растениях семейства (%)		38 (80)	37 (77)	28 (17)	20 (42)	27 (56)	18 (38)	20 (42)	17 (10)

между собой они разбились на две группы. В первую группу вошли Alismataceae и Ranunculaceae, во вторую — все остальные рассматриваемые семейства растений (рис. 3). Между ними коэффициент различия ( $K_p$ ) составил 0,36. Отличие этой пары от других семейств, в первую очередь, связано с тем, что представители частуховых и лютиковых являются гидро- и гигрофитами, произрастающими на заливных лугах. Их посещают виды, преимущественно приуроченные к сырьим местам. Однако между собой эти семейства не обнаружили большого сходства ( $K_p = 0,25$ ). Это, скорее всего, связано с различием в сроках их цветения: Ranunculaceae цветут в мае — первой половине июня, а Alismataceae — во второй половине июля.

Представители семейств растений второй группы произрастают в мезо- и ксерофитных биотопах. Наибольшее сходство оказалось между розоцветными (Rosaceae) и капустовыми (Brassicaceae) ( $K_p = 0,05$ ). Все отмеченные на капустовых видах журчалок (за исключением *Dasyphorus albostriatus*) были встре-

чены и на розоцветных. Вероятно, это связано с перекрыванием сроков цветения видов растений этих семейств, когда цветение изученных основных представителей Rosaceae заканчивается (май — середина июля), а капустовые уже начинают цвети (конец июня — сентябрь). При этом некоторые виды журчалок продолжают посещать цветки капустовых, и сирфидокомплекс этого семейства не изменяется до осени. Отличными от всех оказались сельдерейные (Apiaceae). Своебразие этого семейства объясняется наличием олигофагов. В целом, на уровне семейств растений прослеживается высокое сходство между ними по посещавшим их видам мух- журчалок. Коэффициент различия находится в пределах 0,45.

Для более общего понимания взаимоотношений мух- журчалок с цветковыми растениями проанализировано сходство родов растений по посещающим их видам сирфид. В анализ включены 20 родов растений, посещаемых наибольшим числом видов журчалок.

Роды растений разбились на две основные группы. В первой группе объединились *Salix*, *Caltha* и




Рис. 3. Сходство семейств растений по видовому составу посещающих их мух-журчалок.

Fig. 3. Similarity between plant families according to the composition of hover-fly species.

*Tussilago*. Коэффициент различия между ними и остальными родами растений составил 0,61. Близость этих родов и их отличие от всех остальных не случайны. Мать-и-мачеха (*Tussilago farfara*) и некоторые виды ив цветут ранней весной в конце апреля – второй декаде мая, когда ещё нет ни одного цветущего растения. Калужница и другие виды ив зацветают чуть позже. Кроме того, представители этих родов имеют сходные места произрастания. Наибольшее сходство между этими родами растений оказалось в паре *Caltha* – *Tussilago* (Кр — 0,27) за счёт весенних видов рода *Cheilosia*, с ивами коэффициент различия у них составил 0,38. Это ещё раз подтверждает своеобразие сирфидокомплекса ив, о котором говорилось выше. Необходимо отметить, что у калужницы был небольшой коэффициент различия по видовому составу журчалок и с частухой (*Alisma*), несмотря на разные сроки их цветения (май и июль соответственно) (Кр — 0,31). На наш взгляд, это объясняется тем, что представители этих родов произрастают в одном и том же биотопе – заливных лугах. Это обусловливает встречаемость на них одних и тех же долголетящих видов журчалок.

Вторая группа, в свою очередь, разбилась на две подгруппы с коэффициентом различия 0,48. Первую подгруппу составили роды *Ranunculus*, *Cerasus*, *Taraxacum* и *Spiraea*. Период цветения представителей этих родов приходится на конец мая – начало июня. Наибольший коэффициент различия с этими родами имеет таволга (*Spiraea*) (Кр — 0,44). Своёобразие её сирфидокомплекса обусловлено следующими видами журчалок: *Leucozona laternarius*, *Sphaerophoria loewi*, *Parasyrphus punctulatus*, *Pipiza austriaca*, *Triglyphus primus*, *Cheilosia angustigenis*, *Ch. velutina*, *Ch. vulpina*, *Neoascia carinicauda*, *Orthonevra geniculata*, *Psilotia innupta*, а также видов рода *Temnostoma* Lep. et Serv.

Во второй подгруппе второй группы оказались все остальные роды растений. Период их цветения приходится на вторую половину июня – сентябрь. Необходимо отметить наибольшее сходство родов семейства Apiaceae, цветущих преимущественно в июле, которые образовали один кластер.

Самый большой коэффициент различия со всеми родами оказался у частухи (*Alisma*). Это связано, в первую очередь, с тем, что частуха является влаголюбивым растением и произрастает на заливных лугах. Сирфидокомплекс частухи отличается присутствием большого числа видов журчалок из родов *Platycerius* Lep. et Serv., *Pyrophaena* Schin., *Neoascia* Will., *Chalcosyrphus* Curr.

Для анализа сходства растений на видовом уровне по посещающим их сирфидам был применён метод К-средних, который позволил разбить большое число таксонов на группы по сходству. Наиболее логичным показалось разбиение всех анализируемых 120 видов растений на 5 групп. Первую группу составили растения, преимущественно семейств розоцветных и сельдерейных (33 вида). Во второй группе оказались 28 видов растений, преимущественно из семейств астровых и капустовых. Третью группу составили виды разных семейств, на которых отмечено очень малое число видов журчалок – 1–2. Таких растений оказалось 13 видов. На большинстве из них зарегистрирован только *Sphaerophoria scripta*. В четвёртую группу вошли растения, среди которых оказались все анализируемые представители класса однодольных (22 вида). Пятую группу составили 20 видов различных семейств, без преобладания какого-либо.

В первой и во второй группах оказались растения, встречающиеся в природе крупными популяциями, с обильным количеством цветков. Они являются наиболее привлекательными для сирфид. На этих видах растений зарегистрировано большое количество как видов, так и особей журчалок. На остальных видах было отмечено от 15 видов мух и меньше. Для 24 видов растений из первой и второй групп проанализированы сирфидокомплексы. На этих растениях в период исследования проводились количественные учёты мух-журчалок.

По характеру предпочтения сирфидами рассматриваемые 24 вида растений распределились следующим образом (рис. 4). На первом месте (места распределялись в пределах одного десятка, например, с 50 до 60 видов, с 40 до 50 и т.д.) по посещаемости журчалками оказался одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale*). На нём было отмечено 68 видов журчалок из 23 родов. Второе место заняли, в порядке уменьшения, молочай прутьевидный (*Euphorbia virgata* – 57 видов, 27 родов), таволга городчатая (*Spiraea crenata* – 53 вида, 27 родов) и борщевик сибирский (*Heracleum sibiricum* – 52 вида, 32 рода). На третьем месте стоят калужница болотная (*Caltha palustris* – 45 видов, 17 родов) и пустореберник голый (*Cenolophium denudatum* – 44 вида, 23 рода). На четвертом месте оказались вишня обыкновенная (*Cerasus vulgaris* – 38 видов, 21 род), гулявник Лезеля (*Sisymbrium loeselii* – 37 видов, 19 родов), жабрица порезниковая (*Seseli libanotis* – 34 вида,




Рис. 4. Качественная и количественная характеристика наиболее посещаемых сирфидами видов растений. По левой оси Y — количество видов и родов сирфид, по правой оси Y — обилие сирфид за один учёт.

Fig. 4. Qualitative and quantitative characteristics of the most preferred plant species by hover-flies. Number of hover-fly species and genera (left Y-axis) correlated with the abundance of hover-flies for one registration (right Y-axis).

21 род) и частуха подорожниколистная (*Alisma plantago-aquatica* — 32 вида, 17 родов). Все остальные виды растений стоят на пятом месте, они посещались малым числом видов (от 15 до 30). Это следующие виды: *Salix cinerea*, *S. triandra*, *Ranunculus acris*, *R. repens*, *R. polyanthemos*, *Filipendula vulgaris*, *F. ulmaria*, *Kadenia dubia*, *Pastinaca sylvestris*, *Silaum silaus*, *Sonchus arvensis*, *Tripleurospermum inodorum*, *Tripolium pannonicum*, *Tussilago farfara*.

Анализ сходства вышеперечисленных 24 видов по посещавшим их видам журчалок показал наличие двух основных групп (рис. 5). Первая состоит исключительно из весенних видов (*Salix cinerea*, *S. triandra*, *Tussilago farfara* и *Caltha palustris*), во вторую группу отошли все остальные виды. Коэффициент различия между этими группами составил 0,63.

Сходство внутри первой группы распределилось в парах *Salix cinerea* — *Tussilago farfara* (Кр — 0,44) и *S. triandra* — *C. palustris* (Кр — 0,24). Между этими парами обнаружилось довольно большое различие (Кр — 0,55). Интересным в этом кластере, на наш взгляд, является факт большой близости между видами разных родов — *Salix* и *Tussilago* и *Salix* — *Caltha*. В данном случае в формировании сирфидокомплексов этих видов определяющее значение имеют сроки цветения растений. Первой из всех ив зацветает в конце апреля — начале мая ива пепельная (*Salix cinerea*). В этот же период, а порой чуть раньше, цветёт в тех же биотопах (поймы рек, обочины дорог) мать-и-мачеха обыкновенная (*Tussilago farfara*). Ива трёхтычинковая (*Salix triandra*), напротив,

зацветает одна из последних (вторая половина мая) и период её цветения совпадает с цветением калужницы болотной (*Caltha palustris*).

Во второй группе образовались практически такие же комплексы растений, с некоторыми различиями, как и при анализе родов растений по сходству видового состава мух-журчалок. Первую подгруппу этого кластера (на рисунке 5 кластер 2а) составили весенне — раннелетние виды растений (цветение в конце мая — третьей декаде июня). Во второй подгруппе (на рисунке 5 кластер 2б) один комплекс образовали представители сельдерейных, цветущие в июле и в августе. Необходимо отметить, что жгункорень сомнительный преимущественно цветёт в августе, наибольшее сходство у него было с борщевиком сибирским, цветущим в первой половине июля. Общими для них были следующие виды журчалок, не отмеченные на остальных сельдерейных: *Xanthogramma pedissequum*, *Epistrophe nitidicollis*, а также *Cheilosia vulpina*, *Eristalis intricaria*, зарегистрированные ещё на жабрице порезниковой. Пустореберник голый (*Cenolophium denudatum*) из этого же семейства, цветущий в августе, наибольшее сходство обнаружил с позднецветущими видами растений из семейств Asteraceae и Brassicaceae (рис. 5, кластер 2б). По видовому составу журчалок отличается от всех частуха подорожниколистная (*A. plantago-aquatica*) (Кр — 0,38). О причинах этого различия уже говорилось выше.

Анализ сирфидокомплексов рассматриваемых видов растений на родовом уровне мух-журчалок




Рис. 5. Сходство наиболее посещаемых сирфидами растений по видовому составу мух-журчалок.

Fig. 5. Similarity between most preferred plant species and hover-fly species composition.

практически отразил предыдущую картину, с некоторыми отличиями (рис. 6). Так, наибольший коэффициент различия со всеми остальными имеет ива пепельная ( $K_p = 0,38$ ). Это ещё раз подтверждает своеобразие её энтомокомплекса, в котором преобладают мухи рода *Cheilosia*. Вторым отличным от всех по родовому составу посещающих журчалок оказался лабазник взюлистный ( $K_p = 0,36$ ). Различие связано с посещением этого растения мухами рода *Hammerschmidia Schummel*, отмеченные помимо лабазника только на борщевике сибирском. Остальные виды растений по посещавшим их родам журчалок разбились на два кластера (рис. 6).

В первом кластере оказались все рассматриваемые виды сельдерейных, независимо от сроков их цветения. Во втором кластере, в свою очередь, образовались два комплекса растений ( $K_p = 0,27$ ), причём в каждом из них оказались растения также с разными сроками цветения. Одни из них (на рисунке 6 кластер 2а) представлены растениями из семейств Asteraceae, Brassicaceae, Euphorbiaceae и Rosaceae. Эти виды посещались преимущественно журчалками подсемейства Eristalinae. Во второй группе (на рисунке 6 кластер 2б) объединились представители семейств Rosaceae, Ranunculaceae, Asteraceae, Salicaceae и Alismataceae. Отличными от всех оказались пары: частуха подорожниколистная – мать-и-мачеха обыкновенная ( $K_p$  с остальными — 0,24) и ива трёхтычинковая – калужница болотная ( $K_p$  с остальными — 0,19). Все эти виды растений являются влаголюбивыми. Если у последней пары сроки цветения перекрываются и между ними высоко сходство и по видовому составу журчалок, то частуха подорожниколистная и мать-и-мачеха в сроках цветения имеют большой разрыв (начало мая и конец июля).

В целом, сходство видов растений на родовом уровне мух-журчалок оказалось значительно выше, чем на видовом. Коэффициент различия в первом




Рис. 6. Сходство наиболее посещаемых сирфидами растений по родовому составу мух-журчалок.

Fig. 6. Similarity of the plants most preferred by the genera of hover-fly genera.

случае лежит в пределах всего 0,37, тогда как во втором случае — в пределах 0,63. Таким образом, на формирование сирфидокомплексов видов растений на родовом уровне мух-журчалок особое влияние оказывает таксономическая близость растений, а также их местообитание. Взаимоотношения «вид мухи — вид растения» показали, что на образование комплексов сирфид различных растений влияли большей частью сроки их цветения и биотопическая приуроченность. Период цветения анализируемых видов растений совпадает с лётом определённых видов журчалок, имеющих свои фенологические комплексы. Необходимо отметить, что при одновременном цветении в одном и том же биотопе нескольких растений предпочтение журчалкам отдаётся лишь некоторым из них (рис. 4). Вероятно, в данном случае главную роль играют биохимические особенности цветков каждого из этих растений.

#### Количественный анализ сходства растений по их сирфидокомплексам

Количественные данные позволили глубже понять отношения мух-журчалок с цветковыми растениями. Сходство видов растений по количеству и разнообразию отмеченных на них сирфид определяется двумя факторами: сроками цветения и таксономической близостью растений. На рисунке 7 видно, что сильно отличаются от всех сирфидокомплексы *S. cinerea* ( $K_p = 0,96$ ), пары *C. palustris* – *T. farfara* ( $K_p = 0,91$ ), комплекс видов *S. triandra* – *R. acris* – *R. repens* ( $K_p = 0,75$ ) и *H. sibiricum* ( $K_p = 0,72$ ), о чём свидетельствует большой коэффициент различия каждого из них (на рисунке 7 первый–четвёртый кластеры). На самых ранних видах растений (ива пепельная, мать-и-мачеха, калужница болотная), как уже было отмечено выше, доминировали мухи рода *Cheilosia*. Кроме этого рода, на этих растениях концентрировались и




Рис. 7. Сходство наиболее посещаемых сирфидами растений по обилию мух-журчалок.

Fig. 7. Similarity of the most preferred plants as determined by the abundance of hover-flies.

другие ранневесенние виды журчалок, причём в небольшом количестве (*Platycheirus ambiguus*, *Melanogyna barbibrongs*, *M. triangulifera*, *Cheilosia grossa*). Наибольшая численность журчалок среди перечисленных видов растений была на калужнице болотной. Самыми обильными на ней оказалась *Melanostoma scalarae*, *Dasyphorus nigricornis*, *Cheilosia pubera*, *Ch. reniformis*, *Ch. vernalis* (табл. 2). На иве трёхтычинковой, лютнике едком и лютнике ползучем, произрастающих в одинаковых биотопах (поймах рек и сырьих лугах) весной и ранним летом, большая численность была у *Dasyphorus*, *Sphaerophoria scripta*, *Sph. taeniata*, *Cheilosia albatarsis*, *Ch. pagana*, *Anasymia interpuncta*, *Chysotoxum festivum* (табл. 2). По обилию мух-журчалок борщевик сибирский оказался отличным от остальных сельдерейных. На нём доминировали *Epistrophe diaphana*, *E. grossulariae*, *Syrphus ribesii*, *Xanthogramma pedissequum*, *Cheilosia illustrata illustrata*, *Ch. vulpina*, *Volucella pellucens*, *Myathropa florea* (табл. 3).

В группе с остальными видами растений (пятый кластер) чётко обособились три комплекса (рис. 7). Один из них составили сельдерейные, молочай прутьевидный и гулявник Лезеля (кластер 5б), цветущие во второй половине июня – июле. Виды сельдерейных из этого комплекса (пастернак, жабрица, жгункорень, морковник) не отличаются большим количеством посещающих их журчалок как в качественном, так и в количественном плане (рис. 4). Сходство между ними оказалось за счёт следующих видов журчалок: *Chysotoxum festivum*, *Sphaerophoria scripta*, *Cheilosia velutina*, *Myathropa florea*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis arbustorum*, *Syritta pipiens* (табл. 3).

На гулявнике Лезеля и молочае прутьевидном, произрастающих в одних биотопах (залежи, обочины дорог), большую численность, по сравнению с остальными видами журчалок, показали *Sphaerophoria*

Таблица 2. Обилие мух-журчалок на некоторых видах растений (количество экземпляров/количество учётов).

Table 2. Abundance of hover-flies on some plant species (number of individuals/ frequency of registrations).

Вид сирфид*	Вид растений			
	<i>Calhta palustris</i>	<i>Salix triandra</i>	<i>Ranunculus acris</i>	<i>Ranunculus repens</i>
<i>Melanostoma scalarae</i>	5,4	2,5	2,5	0,6
<i>Dasyphorus nigricornis</i>	4,8	3	0	0
<i>Dasyphorus venustus</i>	5	5,5	17	4,2
<i>Cheilosia pubera</i>	8,4	0	0	0
<i>Ch. reniformis</i>	1,2	0	0	0
<i>Ch. vernalis</i>	4,4	0	0	0
<i>Ch. albatarsis</i>	0	0	2,5	0,8
<i>Ch. pagana</i>	0,4	2,5	0	0
<i>Sphaerophoria scripta</i>	0,4	2	8	0,4
<i>Sph. taeniata</i>	0	0	3,5	0
<i>Anasymia interpuncta</i>	2	7,5	0	0,4
<i>Chysotoxum festivum</i>	0	0	0,5	5,8
Всего отмеченных видов сирфид	45	21	15	26
Суммарное обилие сирфид в одном учете	40	27	39	21

\*В таблице приводятся только преобладающие виды сирфид.

\*Only dominant hover-fly species are given

*scripta*, *Chysotoxum festivum*, *Syrphus vitripennis*, *Anasymia interpuncta*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *Myathropa florea*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis abusiva*, *E. anthophorina*, *E. arbustorum*, *E. pseudorupium*, *Syritta pipiens* (табл. 3).

Второй комплекс пятого кластера (на рисунке 7 кластер 5в) составили как раннелетние виды растений, так и виды, цветущие в августе. С одной стороны, наибольшее сходство оказалось между вишней обыкновенной (*C. vulgaris*), таволгой городчатой (*S. crenata*) и одуванчиком лекарственным (*T. officinale*), цветущих поздней весной – ранним летом, преимущественно на мезофитных лугах. Из всех видов журчалок, отмеченных на этих трёх растениях, доминировали *Sphaerophoria scripta*, *Syrphus ribesii*, *Chysotoxum vernale*, *Dasyphorus venustus*, *Epistrophe nitidicollis*, *Leucozona laternarius*, *Cheilosia angustigena*, *Ch. lasiopa*, *Ch. flavipes*, *Anasymia interpuncta*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *Neoascia tenur*, *Melanostoma scalarae* (табл. 3).

С другой стороны, отмечено сходство между позднецветущими видами растений — пустореберником голым (*C. denudatum*) и трёхреберником непахучим (*T. inodorum*) из семейства Apiaceae, астрой солончаковой паннонской (*T. pannonicum*), осотом полевым (*S. arvensis*) из семейства Asteraceae, а также лютиком многоцветковым (*R. polyanthemos*) из

Таблица 3. Обилие мух-журчалок на некоторых видах растений (количество экземпляров/количество учётов).  
Table 3. Abundance of hover-flies on some plant species (number of individuals/frequency of registrations).

Вид сирфид*	Вид растений														
	<i>Heracleum sibiricum</i>	<i>Kadenia dubia</i>	<i>Silaum silaus</i>	<i>Pastinaca sylvestris</i>	<i>Cenolophium denudatum</i>	<i>Seseli libanotis</i>	<i>Sisymbrium loeselii</i>	<i>Euphorbia virgata</i>	<i>Cerasus vulgaris</i>	<i>Spireae crenata</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	<i>Triplium pannonicum</i>	<i>Sonchus arvensis</i>
<i>Epistrophe diaphana</i>	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>E. grossulariae</i>	0,9	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
<i>E. nitidicollis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,1	0,1	0	0	0	0
<i>Episyphus balteatus</i>	0,6	0	0	0,3	1	0,1	0,2	0	0	0	0	0,3	2	3,4	
<i>Eupeodes corollae</i>	0	0	0	0	0,1	0	0,2	0	0	0,4	0,6	0,3	4,7	0,4	
<i>Dasyphorus venustus</i>	0,1	0	0	0	0	0	0,2	0	3,6	0	1	0	0	0	0
<i>Leucozona laternarius</i>	0,1	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0
<i>Syrphus ribesii</i>	0,8	0	0	0,5	0,5	0,2	0,2	0,3	1,4	1	1,4	1,3	0,3	2	
<i>S. vitripennis</i>	0,3	0	0,1	0,2	0,2	0,1	0,8	0,2	0,4	0,1	0,4	0,7	1,3	0,2	
<i>Xanthogramma pedissequum</i>	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cheilosia illustrata</i>	1,9	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ch. angustigena</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,8	0,3	0	0	0	0	0
<i>Ch. laesiopa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,2	3,8	1,8	0,9	0	0	0	0
<i>Ch. flavipes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0
<i>Ch. vulpina</i>	4,2	0	0	0	0	3	0,2	0	0	0,1	0	0	0	0	0
<i>Ch. velutina</i>	0,2	0	0,1	0,6	1,5	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Volucella pellucens</i>	2	0	0	0	0,1	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0,3	0
<i>Myathropa florea</i>	1,6	0,7	1,4	1,8	1,9	2	2,7	1,8	0,2	0,3	0	0,3	0,7	0,2	
<i>Chrysotoxum festivum</i>	0,9	2,3	0,8	0,1	1,6	0,1	0,7	1,7	0,2	0,1	0	0	1,3	1,4	
<i>Ch. vernale</i>	0	0	0	0	0	0	0	2,5	0,4	1,4	0,8	0	0	0	0
<i>Sphaerophoria scripta</i>	1,1	2	1,6	1,7	11	0	5,2	1	12	2,4	3,7	46	172	13	
<i>Eristalinus sepulchralis</i>	0,1	1	0	1,7	4,9	2	3,2	1	0	0,4	0,5	0,3	7,7	1,8	
<i>E. arbustorum</i>	0,1	1,7	1,1	3,4	1,3	1,8	8	2	1,4	0,6	0,8	3	1,7	1	
<i>E. abusiva</i>	0	1	0,1	0,8	1	0,4	3,2	0,3	0,4	0,1	0,2	2	5,3	1,4	
<i>E. anthophorina</i>	0,1	0	0	0	0,1	0	1,7	0,3	0,2	0	0	0,7	1,7	0,4	
<i>E. interrupta</i>	0,3	0	0,1	0,8	0,3	1,7	0,3	0,3	0,6	0,9	0,6	0,3	1,7	1,2	
<i>E. pseudorupium</i>	0,1	0	0	0	0,2	0	0,7	0,5	0	1,6	0,1	0	0	0	
<i>E. tenax</i>	0	0,7	0	0	0,1	0,2	0,2	0	0	0	0	11	0	1,2	
<i>Syritta pipiens</i>	0,1	0,3	1,3	0	2	1	6	3	0,2	0,6	0,2	1,3	6,7	0	
<i>Anasymyia interpuncta</i>	0	0	0	0	0	0	2,2	0,2	1,4	0	2	0	0	0	
<i>Helophilus hybridus</i>	0,3	0	0	0,3	1,1	0,7	2,2	3,3	1,4	0,8	1,7	0,7	7	3	
<i>H. parallelus</i>	0	0,3	0	0,2	0,6	0	4,2	2,8	5,8	0,3	1	5,7	15	0,4	
<i>H. pendulus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,3	0,6	
<i>Neoascia tenur</i>	0	0	0	0	0,3	0	0	0	3,2	0	0,5	0	0	0,2	
<i>Melanostoma scalare</i>	0,1	0,7	0,2	0,1	0,5	0,2	0,3	0	0,8	0	1,7	0	0	0,2	
Всего отмеченных видов сирфид	52	21	23	35	44	34	37	57	38	53	68	28	22	26	
Суммарное обилие сирфид в одном учете	20	11	8	15	37	19	51	27	42	18	26	78	239	34	

\* В таблице приводятся только преобладающие виды сирфид.

семейства Ranunculaceae. Почти все эти виды были в одном комплексе по сходству посещающих их сирфид. Наибольшая численность на этих видах растений оказалась у *Chrysotoxum festivum*, *Episyrrhus balteatus*, *Eupeodes corollae*, *Sphaerophoria scripta*, *Syrphus vitripennis*, *S. ribesii*, *Cheilosia velutina*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *Myathropa florea*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis abusiva*, *E. arbustorum*, *E. interrupta*, *Eristalis tenax*, *Syritta pipiens* (табл. 3).

Можно видеть, что в кластерах 5а и 5б объединились комплексы растений, сроки цветения которых не совпадают. Это произошло, скорее всего, за счёт растянутого периода лёта некоторых видов журчалок, которые дают не одно поколение в году. Об этом свидетельствует разница их численности на протяжении всего сезона.

Частуха подорожниколистная как по обилию, так и по видовому составу посещающих её видов сирфид оказалась отличной от всех видов растений (Кр — 0,66). На ней доминировали *Melanostoma scalare*, *Platycheirus clypeatus*, *P. fulviventris*, *Pyrophaena granditarsis*, *Episyrrhus balteatus*, *Sphaerophoria scripta*, *Parhelophilus consimilis*, *Eristalinus sepulchralis*, *Neoascia aenea*, *Anasymyia lineata*.

Таким образом, сходство видов растений по обилию посещающих их журчалок обусловлено, скорее всего, массовым вылетом определённого комплекса мух (весеннего, летнего, весенне-летнего) и за счёт растянутого периода лёта некоторых видов сирфид. Можно видеть, что во всех перечисленных выше комплексах растений доминируют практически одни и те же виды журчалок: *Sphaerophoria scripta*, *Chrysotoxum festivum*, *Syrphus ribesii*, *Syritta pipiens*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *Myathropa florea*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis arbustorum*. Численность каждого из них, однако, различна на определённом виде растения. Так, *Sphaerophoria scripta* встречался на всех рассматриваемых растениях, но наибольшая его численность была на астре солончаковой паннонской (170 экз./учёт). За счёт этого последний вид растения занимает первое место по численности журчалок, хотя общее число зарегистрированных видов мух на нём невелико (рис. 4). Второе место по численности журчалок занял трёхреберник непахучий (78 экз./учёт), на котором также было отмечено малое количество видов сирфид. На этом растении максимальной численности достигли *Sphaerophoria scripta*, *Helophilus parallelus*, *Eristalis arbustorum*. Эти виды, а также *Syritta pipiens*, *Myathropa florea*, *Eristalinus sepulchralis* высокую численность дали на гулявнике Лезеля, который тем самым выделился от растений с богатой сирфидофаяной. На рисунке 4 более или менее прослеживается тенденция: чем больше видов журчалок посещают конкретный вид растения, тем меньше общая численность их на нём, и наоборот. Это связано, возможно, во-первых, с конкуренцией насекомых за корм, а во-вторых, с предпочтением некоторыми журчалками определённых видов растений.

#### АНАЛИЗ КОРМОВОГО СПЕКТРА РАСТЕНИЙ МУХ-ЖУРЧАЛОК

Большинство сирфид являются полифагами (114 видов, или 70%). Кроме них, для исследуемой территории обнаружены олигофаги. К ним относятся 12 видов (7%): *Epistrophe diaphana*, *Melangyna guttata*, *M. compositarum*, *Xanthogramma pedissequum*, *Chrysotoxum lineare*, *Pipizella maculipennis*, *Cheilosia illustrata*, *Ch. grossa*, *Ch. motodomariensis*, *Ch. scutellata*, *Lejogaster tarsata*, *Chrysogaster cemiteriorum*. Все эти виды были встречены только на сельдерейных, кроме *Ch. grossa*, который зарегистрирован весной на ивах (табл. 5). Необходимо отметить, что такие виды, как *Epistrophe grossularia*, *Scaeva pyrastri*, *Chrysotoxum bicinctum* практически всегда встречались только на растениях семейства Apiaceae, но единично каждый вид был отмечен на растениях из других семейств (*S. pyrastri* на *Erodium cicutarium*, *E. grossularia* на *Sonchus arvensis*, *Ch. bicinctum* на *Potentilla erecta*). Возможно, посещение этих растений у журчалок было случайным.

Видов сирфид, отмеченных только на одном виде растений, зарегистрировано 39 (23%) из родов *Didea*,

Таблица 4. Количество семейств и видов растений, посещаемых некоторыми видами мух-журчалок.

Table 4. Number of plant families and species visited by some hover flies.

Вид сирфид	Количество посещаемых семейств растений	Количество посещаемых видов растений
<i>Sphaerophoria scripta</i>	19	75
<i>Helophilus hybridus</i>	18	53
<i>Syritta pipiens</i>	14	44
<i>Syrphus ribesii</i>	12	38
<i>Helophilus parallelus</i>	11	40
<i>Helophilus pendulus</i>	11	24
<i>Chrysotoxum festivum</i>	10	32
<i>Eristalinus sepulchralis</i>	10	32
<i>Eristalis intricaria</i>	10	20
<i>Anasymyia interpuncta</i>	10	24
<i>Eristalis arbustorum</i>	9	42
<i>Eristalis interrupta</i>	9	32
<i>Melanostoma scalare</i>	9	31
<i>Dasyphorus venustus</i>	9	21
<i>Eristalis anthophorina</i>	9	20
<i>Eristalis abusiva</i>	7	30
<i>Eristalis pseudorupium</i>	7	20
<i>Episyrrhus balteatus</i>	7	21
<i>Eupeodes corollae</i>	6	20
<i>Syrphus vitripennis</i>	6	20
<i>Myathropa florea</i>	5	24

*Epistrophe, Melangyna, Meliscaeva, Sphaerophoria, Syrphus, Chrysotoxum, Platycheirus, Pyrophaena, Neocnemodon, Pipiza, Pipizella, Trichopsomyia, Cheilosia, Brachyopa, Neoascia, Orthonevra, Eumerus, Psi-lota, Eristalis, Temnostoma* (табл. 5). Мы считаем их условными монофагами, т.к. многие из них найдены в единичном экземпляре и при дополнительных исследованиях, скорее всего, они будут отмечены и на других кормовых растениях.

Из всех 114 полифагов можно выделить 21 вид журчалок, в кормовом спектре которых находится свыше 20 видов растений. Данные виды представлены в таблице 4.

Больше всего растений в кормовом спектре у *Sphaerophoria scripta* (63% от общего числа всех растений), причём преобладают розоцветные, сельдерейные и астровые (табл. 5). Максимальная численность *Sphaerophoria scripta* оказалась на астровых (*T. ruppinicum* и *T. inodorum*). Из розоцветных высокая численность была на вишне обыкновенной (11,6 экз./учёт), а из сельдерейных — на пусторебернике голом (11 экз./учёт). Этот вид журчалок является самым экологически пластичным, вероятно, дающим не одно поколение в году.

В кормовой базе *Syritta pipiens*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis abusiva*, *E. arbustorum*, *E. interrupta*, *Chrysotoxum festivum*, *Syrphus ribesii*, *Episyphus balteatus* также оказалось преобладание розоцветных, сельдерейных и астровых, но максимальная численность каждого из них была на разных видах растений. *Episyphus balteatus* из астровых был обилен на осоте полевом, из сельдерейных — на пусторебернике голом, а также на частухе подорожниколистной из частуховых. На розоцветных его доля составила меньше единицы (табл. 3). *Chrysotoxum festivum* был обилен на лятике ползучем, *Syritta pipiens* и *Eristalis arbustorum* — на гулявнике Лезеля (табл. 2, 3). *Syrphus ribesii* был многочисленен из астровых на осоте полевом, из розоцветных — на вишне обыкновенной, из сельдерейных — на борщевике сибирском. Все остальные, так же как и вышеупомянутые, высокую численность показали на астре солончаковой панонской.

*Myathropa florea*, *Syrphus vitripennis*, *Eupeodes corollae* в своей кормовой базе имеют больше представителей из Asteraceae и Apiaceae. Первые два вида журчалок оказались многочисленными на гулявнике Лезеля, а *Eupeodes corollae* — на астре солончаковой панонской (табл. 3).

*Helophilus pendulus*, *Anasymyia interpuncta* чаще всего встречались на представителях семейств Rosaceae и Asteraceae. Максимальная численность *Helophilus pendulus* была на астре солончаковой панонской, а *Anasymyia interpuncta* — на иве трёхтычинковой (табл. 2, 3).

Розоцветные и сельдерейные преобладали в спектре питания у *Melanostoma scalare*, однако, обилен этот вид был на калужнице болотной. *Dasyphorus venustus* больше всего посещал лятиковые и розоцветные, его максимальная численность была на лютике едком (табл. 2).

В кормовой базе *Eristalis anthophorina* и *E. intricaria* преобладают астровые, а у *E. pseudorupium* — сельдерейные. Численность первых двух видов оказалась максимальной на гулявнике Лезеля, а последнего — на таволге городчатой (табл. 3).

## Обсуждение

Полученные данные по кормовым преференциям журчалок можно сравнить лишь с имеющимися данными о взаимоотношениях с цветковыми растениями мух рода *Cheilosia* Mg. [Баркалов, Бурлак, 2000]. При этом находим некоторые несоответствия. А именно, *Cheilosia illustrata illustrata*, *Ch. grossa*, *Ch. motodomariensis*, *Ch. scutellata*, относящиеся у нас к олигофагам, в приводимой работе таковыми не являются. *Cheilosia mutabilis*, являющийся самым полилектичным видом во многих районах Палеарктики, в Южном Зауралье встречался только на борщевике сибирском и единственный раз был отмечен на подмареннике русском (*Gallium ruthenicum*). Однако, у *Cheilosia velutina* в кормовой базе также преобладает доля сельдерейных. Остальные виды этого рода, как было указано выше, встречались на разных семействах растений.

При сопоставлении наших данных количественных учётов имаго на определённом растении с данными Длусского и Лавровой (2001) о количественном составе пыльцы в кишечнике некоторых видов сирфид мы нашли интересные совпадения. Так, пыльца осота полевого в значительном количестве присутствовала (в порядке уменьшения) у *Episyphus balteatus*, *Syrphus ribesii*, *S. vitripennis*, *Helophilus pendulus*, *Eristalis interrupta*, *E. arbustorum*. В наших учётах на цветках осота доминировали несколько видов журчалок из родов *Eristalis*, *Helophilus*, *Syrphus*, *Chrysotoxum*, *Episyphus*. Среди преобладавших журчалок этих родов были виды, которые приведены в работе Длусского. Кроме того, численность *Episyphus balteatus* преобладала над численностью *Syrphus ribesii*, а численность *Eristalis interrupta* — над *E. arbustorum*. Однако журчалки из рода *Eristalis* доминировали над остальными. Помимо пыльцы осота у *Eristalis arbustorum* и *Syrphus ribesii*, по результатам исследований Длусского и Лавровой [2001], в большем количестве оказалась пыльца трёхреберника и тысячелистника. В наших учётах на трёхребернике эти виды находились в числе доминантов, кроме того, численность *Eristalis arbustorum* оказалась выше на этом растении, а у *Syrphus ribesii* примерно такой же. Из анализируемых Длусским и Лавровой видов журчалок (11 видов) следует отметить *Myathropa florea*, в кишечнике которого преобладала пыльца сельдерейных. В наших учётах этот вид также чаще и в большем количестве посещал представителей этого семейства. В кормовой базе большинства мух-журчалок из рода *Eristalis* в Южном Зауралье преобладали астровые, только у *E. arbustorum* и *E. interrupta* в качестве источника питания отмечено значительное количество розоцветных, причём *E. interrupta* предпочитал розоцветные всем остальным семействам (табл. 5). Пыльцу лабазника Длусский и

Таблица 5. Список растений, посещаемых сирфидами (Syrphidae).  
 Table 5. List of plants visited by hover-flies (Syrphidae).

Семейство/вид растения	Вид журчалки
сем. <b>Typhaceae</b>	
<i>Typha latifolia</i>	<i>Lejops vittatus</i>
сем. <b>Alismataceae</b>	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus angustatus</i> , <i>P. fulviventris</i> , <i>P. clypeatus</i> , <i>P. immarginatus</i> , <i>P. scambus</i> , <i>Pyrophaena granditarsis</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes latifasciatus</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Cheilosia pagana</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophotina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>A. lineata</i> , <i>A. transfuga</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Lejops vittatus</i> , <i>Parhelophilus consimilis</i> , <i>P. versicolor</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>N. carinicauda</i> , <i>N. tenur</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
сем. <b>Butomaceae</b>	
<i>Butomus umbellatus</i>	<i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Eristalis intricaria</i>
сем. <b>Poaceae</b>	
<i>Alopecurus pratensis</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>P. fulviventris</i>
<i>Phleum phleoides</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>P. fulviventris</i>
<i>Poa pratensis</i>	<i>Melanostoma scalare</i>
сем. <b>Cyperaceae</b>	
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	<i>Anasimyia interpuncta</i>
<i>Eleocharis palustris</i>	<i>Platycheirus sp.</i>
<i>E. uniglumis</i>	<i>Melanostoma scalare</i>
сем. <b>Alliaceae</b>	
<i>Allium cepa</i>	<i>Eumerus strigatus</i> , <i>E. tuberculatus</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
сем. <b>Salicaceae</b>	
<i>Salix bebbiana</i>	<i>Eupeodes latifasciatus</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
<i>S. cinerea</i>	<i>Melangyna barbifrons</i> , <i>M. lasiophtalma</i> , <i>M. triangulifera</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>Platycheirus ambiguus</i> , <i>P. angustatus</i> , <i>Triglyphus primus</i> , <i>Cheilosia angustigena</i> , <i>Ch. fraterna</i> , <i>Ch. grossa</i> , <i>Ch. lasiopa</i> , <i>Ch. impressa</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Ch. proxima</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Helophilus parallelus</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
<i>S. pentandra</i>	<i>Melanostoma sp.</i> , <i>Orthonevra incisa</i>
<i>S. triandra</i>	<i>Dasysyrphus nigricornis</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Epistrophe nitidicollis</i> , <i>Eupeodes lundbecki</i> , <i>E. luniger</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. virgata</i> , <i>Cheilosia albipila</i> , <i>Ch. nebulosa</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Orthonevra incisa</i> , <i>Neoascia tenur</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>A. transfuga</i> , <i>Helophilus parallelus</i> , <i>Syrrita pipiens</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>S. vinogradovii</i>	<i>Eupeodes latifasciatus</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>S. rosmarinifolia</i>	<i>Melangyna lasiophtalma</i> , <i>Cheilosia praecox</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
<i>Salix sp.</i>	<i>Melangyna lasiophtalma</i> , <i>Cheilosia grossa</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
сем. <b>Caryophyllaceae</b>	
<i>Eremogone longifolia</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Crysotoxum festivum</i> , <i>Ch. vermale</i> , <i>Cheilosia flavipes</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Syrrita pipiens</i>
<i>Psammophiliella muralis</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
сем. <b>Ranunculaceae</b>	
<i>Adonis vernalis</i>	<i>Cheilosia praecox</i> , <i>Neoascia carinicauda</i> , <i>Eristalis abusiva</i>
<i>Anemone sylvestris</i>	<i>Dasysyrphus venustus</i>
<i>Caltha palustris</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>P. fulviventris</i> , <i>Dasysyrphus arcuatus</i> , <i>D. nigricornis</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes latifasciatus</i> , <i>Melangyna lasiophtalma</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. virgata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Pipiza bimaculata</i> , <i>Orthonevra geniculata</i> , <i>O. incisa</i> , <i>Neoascia carinicauda</i> , <i>N. interrupta</i> , <i>N. tenur</i> , <i>Cheilosia albipila</i> , <i>Ch. alpina</i> , <i>Ch. chloris</i> , <i>Ch. fraterna</i> , <i>Ch. nebulosa</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Ch. pubera</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>A. lineata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. cryptarum</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. lineata</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. oestracea</i> , <i>E. pseudoruprum</i> , <i>E. rupium</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>Pulsatilla uralensis</i>	<i>Cheilosia alba</i> , <i>Ch. kuznetzovae</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. praecox</i>
<i>Ranunculus acris</i>	<i>Dasysyrphus venustus</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Cheilosia albiparsis</i> , <i>Ch. latifrons</i> , <i>Pipiza austriaca</i> , <i>Neoascia tenur</i> , <i>Anasimyia lineata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>R. polyanthemos</i>	<i>Dasysyrphus venustus</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Cheilosia albiparsis</i> , <i>Ch. velutina</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>Helophilus hybridus</i>
<i>R. repens</i>	<i>Dasysyrphus venustus</i> , <i>Epistrophe nitidicollis</i> , <i>Eupeodes nitens</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Ch. vermale</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Cheilosia albiparsis</i> , <i>Ch. carbonaria</i> , <i>Ch. fraterna</i> , <i>Orthonevra stackelbergi</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>Eumerus strigatus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>A. lineata</i> , <i>A. transfuga</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Syrrita pipiens</i>

Таблица 5. (продолжение).  
Table 5. (continuation).

Семейство/вид растения	Вид журчалки
<i>Ranunculus silvosteppeus</i>	<i>Eristalis abusiva</i>
<i>Trollius europaeus</i>	<i>Eristalis pseudorupium</i>
сем. <i>Brassicaceae</i>	
<i>Armoracia rusticana</i>	<i>Anasimyia interpuncta, Eristalis arbustorum</i>
<i>Berteroia incana</i>	<i>Sphaerophoria scripta, Eristalinus sepulchralis, Lathyronephthalma aeneus, Eristalis abusiva, E. anthophorina, E. arbustorum, E. interrupta, Helophilus hybridus, H. parallelus, Myathropa florea, Syritta pipiens</i>
<i>Brasica campestris</i>	<i>Episyphus balteatus, Eupeodes corolle, Syrphus ribesii, S. torvus, S. vitripennis, Sphaerophoria scripta, Helophilus pendulus</i>
<i>Lepidium latifolium</i>	<i>Eristalinus sepulchralis, Neoascia sp.</i>
<i>Rorippa brachycarpa</i>	<i>Melanostoma scalare</i>
<i>Sisymbrium loeselii</i>	<i>Melanostoma scalare, Dasysyrphus albostriatus, D. lunulatus, D. venustus, Episyphus balteatus, Eupeodes corolle, E. latifasciatus, E. nitens, Syrphus ribesii, S. torvus, S. vitripennis, Sphaerophoria scripta, Chrysotoxum festivum, Cheilosia vulpina, Pipizella viduata, Eristalinus sepulchralis, Lathyronephthalma aeneus, Eristalis abusiva, E. anthophorina, E. arbustorum, E. intricaria, E. interrupta, E. pseudorupium, E. rupium, E. tenax, Anasimyia interpuncta, A. transfuga, Helophilus hybridus, H. parallelus, H. pendulus, Parhelophilus consimilis, P. frutetorum, P. versicolor, Mallota tricolor, Myathropa florea, Ceriana conopoides, Syritta pipiens</i>
сем. <i>Grossulariaceae</i>	
<i>Ribes aureum</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
сем. <i>Rosaceae</i>	
<i>Agrimonia pilosa</i>	<i>Volucella pellucens</i>
<i>Amelanchier spicata</i>	<i>Dasysyrphus nigricornis, D. venustus, Melanostoma scalare, Epistrophe nitidicollis, Eupeodes nitens, Sphaerophoria scripta, Parasyrphus nigritarsis, Cheilosia proxima, Orthonevra incisa, Eristalis abusiva, E. arbustorum, E. interrupta, E. picea, Helophilus hybridus, Anasimyia interpuncta</i>
<i>Aronia melanocarpa</i>	<i>Epistrophe nitidicollis, Syrphus ribesii, Sphaerophoria scripta, Cheilosia impressa, Ceriana conopoides, Eristalinus sepulchralis</i>
<i>Cerasus vulgaris</i>	<i>Dasysyrphus arcuatus, D. lunulatus, D. tricinctus, D. venustus, Epistrophe euchroma, E. nitidicollis, Eupeodes latifasciatus, E. latilunulatus, E. nitens, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, Chrysotoxum festivum, Ch. verna, Melanostoma scalare, Platycerius peltatus, Neocnemodon vitripennis, Pipizella viduata, Cheilosia fraterna, Ch. laisiopa, Ch. nebulosa, Ch. praecox, Neoascia tenur, Ceriana conopoides, Eristalis abusiva, E. anthophorina, E. arbustorum, E. intricaria, E. interrupta, E. rupium, Anasimyia interpuncta, Helophilus hybridus, H. parallelus, Mallota megilliformis, Myathropa florea, Syritta pipiens, Chalcosyrphus nemorum, Ch. femorata</i>
<i>Filipendula vulgaris</i>	<i>Dasysyrphus venustus, Didea fasciata, Eupeodes latilunulatus, Chrysotoxum festivum, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. torvus, Volucella bombylans, Ceriana conopoides, Anasimyia interpuncta, A. transfuga, Helophilus hybridus, H. parallelus, Parhelophilus frutetorum, Lejops vittatus, Eristalinus sepulchralis, Eristalis abusiva, E. anthophorina, E. interrupta, E. intricaria, E. rossica, E. rupium, E. pseudorupium, Mallota eurasatica, M. megilliformis, Mesembrius peregrinus, Myathropa florea, Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>F. ulmaria</i>	<i>Dasysyrphus venustus, Episyphus balteatus, Melangyna arctica, M. triangulifera, Sphaerophoria scripta, Syrphus vitripennis, Chrysotoxum festivum, Melanostoma scalare, Pipiza nocticula, Hammerschmidia ferruginea, Volucella pellucens, Eristalis arbustorum, E. interrupta, Helophilus hybridus, H. pendulus, Parhelophilus consimilis, P. versicolor, Anasimyia interpuncta</i>
<i>Fragaria vesca</i>	<i>Dasysyrphus venustus, Eupeodes corolle, Chrysotoxum festivum, Sphaerophoria scripta, Sph. taeniata, Syrphus ribesii, S. torvus, Pipizella viduata, Helophilus pendulus, Eristalis arbustorum, E. interrupta, E. rupium, E. pseudorupium, Syritta pipiens</i>
<i>F. viridis</i>	<i>Sphaerophoria scripta, Sph. taeniata, Chrysotoxum festivum, Syrphus ribesii, Pipizella viduata, Anasimyia interpuncta, A. lineata, Helophilus parallelus, Eristalinus sepulchralis, Eristalis arbustorum, E. interrupta, Syritta pipiens</i>
<i>Malus baccata</i>	<i>Dasysyrphus nigricornis, D. tricinctus, D. venustus, Epistrophe nitidicollis, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, Melanostoma scalare, Eristalis anthophorina, Anasimyia interpuncta, Helophilus parallelus, Syritta pipiens, Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>Padus avium</i>	<i>Dasysyrphus tricinctus, D. venustus, Melangyna triangulifera, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, S. torvus, Melanostoma scalare, Cheilosia cynocephala, Ch. flavipes, Ch. gigantea, Ch. laisiopa, Neoascia carinicauda, Eristalis arbustorum, Anasimyia interpuncta, Brachyopa cinerea, Syritta pipiens</i>
<i>Potentilla anserina</i>	<i>Episyphus balteatus, Chrysotoxum festivum, Neoascia aenea, N. tenur, Helophilus hybridus, H. pendulus, Eristalis arbustorum, Syritta pipiens</i>
<i>P. argentea</i>	<i>Episyphus balteatus, Eupeodes lundbecki, Sphaerophoria scripta, Pipicella viduata</i>
<i>P. erecta</i>	
<i>P. glaucescens</i>	<i>Cheilosia praecox, Syritta pipiens</i>
<i>Potentilla humifusa</i>	<i>Eupeodes flaviceps, E. latifasciatus, E. lundbecki, Cheilosia chloris, Ch. praecox, Ch. vernalis, Ch. zmilampis, Helophilus parallelus</i>
<i>Pyrus sp.</i>	<i>Melanostoma scalare, Dasysyrphus venustus, Didea sp., Eupeodes latifasciatus, Sphaerophoria chongjini, Sph. scripta, Syrphus ribesii, Trichopsomyia flavitarsis, Anasimyia interpuncta, Helophilus parallelus, Eristalis interrupta, E. intricaria, E. tenax, Myathropa florea, Chalcosyrphus nemoum</i>

Таблица 5. (продолжение).  
Table 5. (continuation).

Семейство/вид растения	Вид журчалки
<i>Rosa majalis</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Neoascia carinicauda</i>
<i>Sanguisorba officinalis</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>Sorbus aucuparia</i>	<i>Dasysyrphus tricinctus</i> , <i>Pipizella viduata</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. rupium</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Parhelophilus versicolor</i>
<i>Spiraea crenata</i>	<i>Dasysyrphus lunulatus</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Didea alneti</i> , <i>Epistrophe nitidicollis</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. luniger</i> , <i>Parasyrphus punctulatus</i> , <i>Sphaerophoria loewi</i> , <i>Sph. scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Ischyrosyrphus latemarius</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Ch. vernale</i> , <i>Triglyphus primus</i> , <i>Pipiza austriaca</i> , <i>P. bimaculata</i> , <i>Pipizella viduata</i> , <i>Cheilosia angustigena</i> , <i>Ch. fraterma</i> , <i>Ch. gigantea</i> , <i>Ch. kuznetzovae</i> , <i>Ch. laevis</i> , <i>Ch. impressa</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. proxima</i> , <i>Ch. velutina</i> , <i>Ch. vulpina</i> , <i>Orthonevra geniculata</i> , <i>Neoascia carinicauda</i> , <i>N. tenur</i> , <i>Psilota innupta</i> , <i>Ceriana conopoides</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. alpina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>E. rossica</i> , <i>E. rupium</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Parhelophilus versicolor</i> , <i>Mallota eurasatica</i> , <i>M. megilliformis</i> , <i>M. tricolor</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i> , <i>Temnostoma apiforme</i> , <i>T. bombylans</i> , <i>T. vespiforme</i> , <i>Chalcosyrphus femoratus</i>
сем. Geraniaceae	
<i>Erodium cicutarium</i>	<i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>Scaeva pyrastri</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Platycheirus albimanus</i> , <i>Eristalis tenax</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i>
<i>Geranium pratense</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. pendulus</i>
сем. Euphorbiaceae	
<i>Euphorbia semivillosa</i>	<i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Ch. vernale</i> , <i>Paragus quadrifasciatus</i> , <i>Pipizella viduata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i>
<i>Euphorbia virgata</i>	<i>Dasysyrphus tricinctus</i> , <i>Paragus quadrifasciatus</i> , <i>Epistrophe melanostoma</i> , <i>Eupeodes latifasciatus</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>E. nitens</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Ch. octomaculatum</i> , <i>Ch. rubzovi</i> , <i>Ch. vernale</i> , <i>Pipiza festiva</i> , <i>Pipizella viduata</i> , <i>P. annulata</i> , <i>Triglyphus primus</i> , <i>Cheilosia barbata</i> , <i>Ch. gigantea</i> , <i>Ch. laevis</i> , <i>Ch. impressa</i> , <i>Ch. latifrons</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Ch. proxima</i> , <i>Ch. vulpina</i> , <i>Volucella bombilans</i> , <i>V. pellucens</i> , <i>Orthonevra erythrogona</i> , <i>Eumerus strigatus</i> , <i>E. tuberculatus</i> , <i>Ceriana conopoides</i> , <i>Anasimyia lineata</i> , <i>A. interpuncta</i> , <i>A. transfugus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. lineata</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. rossica</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Parhelophilus frutetorum</i> , <i>P. versicolor</i> , <i>Lejops vittatus</i> , <i>Mallota eurasatica</i> , <i>M. megilliformis</i> , <i>M. tricolor</i> , <i>Mesembrius peregrinus</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i> , <i>Xylota femorata</i>
сем. Tiliaceae	
<i>Tilia cordata</i>	<i>Syritta pipiens</i>
сем. Lythraceae	
<i>Lythrum salicaria</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalis intricaria</i> , <i>E. oestracea</i>
<i>L. virgatum</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Eristalis anthophorina</i> , <i>E. intricaria</i>
сем. Onagraceae	
<i>Chamerion angustifolium</i>	<i>Volucella bombilans</i>
сем. Apiaceae	
<i>Aegopodium podagraria</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Spilomyia diophtalma</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Anethum graveolens</i>	<i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>E. luniger</i> , <i>Scaeva pyrastri</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Platycheirus fulviventris</i> , <i>Eumerus tuberculatus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Angelica sylvestris</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Ischyrosyrphus latemarius</i> , <i>Cheilosia illustrata illustrata</i> , <i>Ch. motodomariensis</i> , <i>Ch. velutina</i> , <i>Pipiza bimaculata</i> , <i>P. lugubris</i> , <i>Volucella pellucens</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>E. rupium</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Spilomyia diophtalma</i>
<i>Cenolophium denudatum</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus clypeatus</i> , <i>P. fulviventris</i> , <i>Didea alneti</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>Melangyna guttata</i> , <i>Scaeva pyrastri</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus admirandus</i> , <i>S. ribesii</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Chrysotoxum bicinctum</i> , <i>Ch. festivum</i> , <i>Ch. lineare</i> , <i>Ch. octomaculatum</i> , <i>Pipiza nocticula</i> , <i>Pipizella maculipennis</i> , <i>Cheilosia illustrata illustrata</i> , <i>Ch. scutellata</i> , <i>Ch. velutina</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>N. tenur</i> , <i>Ceriana conopoides</i> , <i>Volucella pellucens</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Parhelophilus consimilis</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>E. rossica</i> , <i>E. rupium</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Spilomyia diophtalma</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Cicuta virosa</i>	<i>Cheilosia pagana</i> , <i>Neoascia tenur</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Conium maculatum</i>	<i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Daucus sativus</i>	<i>Dasysyrphus tricinctus</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Epistrophe nitidicollis</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Melangyna compositarum</i> , <i>Eupeodes flaveeps</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>Scaeva pyrastri</i> , <i>S. selenitica</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Cheilosia scutellata</i> , <i>Eumerus strigatus</i> , <i>E. tuberculatus</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Eryngium planum</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Volucella pellucens</i> , <i>Eristalis anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>Syritta pipiens</i>

Таблица 5. (продолжение).  
Table 5. (continuation).

Семейство/вид растения	Вид журчалки
<i>Heracleum sibiricum</i>	<i>Melanostoma scalare, Platycerius albimanus, Dasysyrphus venustus, Epistrophe diaphana, E. grossularia, Episyphus balteatus, Eupeodes latilunulatus, Ischyrosyrphus latemarius, Melangyna umbellatarum, Melangyna guttata, Meliscaeva cinctella, Scaeva pyrastri, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, Xanthogramma pedissequum, Chrysotoxum bicinctum, Ch. festivum, Ch. lineare, Pipiza austriaca, Pipizella maculipennis, Cheilosia cynocephala, Ch. barbata, Ch. gigantea, Ch. illustrata illustrata, Ch. impressa, Ch. motodomariensis, Ch. mutabilis, Ch. praecox, Ch. scutellata, Ch. velutina, Ch. vulpina, Volucella pellucens, Hammerschmidia ferruginea, Eristalinus sepulchralis, Eristalis abusiva, E. anthophorina, E. arbustorum, E. interrupta, E. intricaria, E. pseudorupium, Helophilus hybridus, H. parallelus, Parhelophilus versicolor, Mallota tricolor, Myathropa florea, Chrysogaster cemiteriorum, Eumerus strigatus, Ceriana conopoides, Spilogomyia diophthalma, Chalcosyrphus nemorum, Syritta pipiens</i>
<i>Kadenia dubia</i>	<i>Melanostoma scalare, Epistrophe nitidicollis, Eupeodes corolle, E. lundbecki, Scaeva pyrastri, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, Xanthogramma pedissequum, Chrysotoxum festivum, Cheilosia vulpina, Eristalinus sepulchralis, Eristalis abusiva, E. arbustorum, E. intricaria, E. pseudorupium, E. tenax, Helophilus hybridus, H. parallelus, Myathropa florea, Syritta pipiens</i>
<i>Pastinaca sylvestris</i>	<i>Melanostoma scalare, Episyphus balteatus, Epistrophe diahpana, E. grossularia, Melangyna compositarum, M. cincta, M. saytshenkoi, Scaeva pyrastri, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, Chrysotoxum bicinctum, Ch. festivum, Triglyphus primus, Cheilosia impressa, Ch. scutellata, Ch. velutina, Ch. vernalis, Volucella inanis, Eumerus strigatus, Myathropa florea, Helophilus hybridus, H. parallelus, Parhelophilus versicolor, Eristalinus sepulchralis, Eristalis abusiva, E. arbustorum, E. interrupta, E. tenax, E. pseudorupium, Chrysogaster cemiteriorum, Lejogaster tarsata, Myathropa florea, Spilogomyia diophthalma, Syritta pipiens</i>
<i>Seseli libanotis</i>	<i>Melanostoma scalare, Episyphus balteatus, Epistrophe diaphana, E. grossularia, Ischyrosyrphus latemarius, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. vitripennis, Chrysotoxum bicinctum, Ch. festivum, Pipizella annulata, P. divicoi, P. maculipennis, Cheilosia proxima, Ch. scutellata, Ch. velutina, Ch. vulpina, Volucella pellucens, Lejogaster tarsata, Eumerus tuberculatus, Ceriana conopoides, Eristalinus sepulchralis, Eristalis abusiva, E. arbustorum, E. intricaria, E. interrupta, E. rupium, E. tenax, Helophilus hybridus, Parhelophilus versicolor, Lejops vittatus, Myathropa florea, Spilogomyia diophthalma, Syritta pipiens</i>
<i>Silaum silaus</i>	<i>Melanostoma scalare, Epistrophe grossularia, Melangyna guttata, Eupeodes corolle, E. latifasciatus, E. lundbecki, Scaeva pyrastri, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, S. torvus, S. vitripennis, Chrysotoxum festivum, Pipizella maculipennis, Cheilosia illustrata illustrata, Ch. velutina, Eristalis abusiva, E. arbustorum, E. pseudorupium, E. rossica, Myathropa florea, Spilogomyia diophthalma, Syritta pipiens</i>
<i>Valeriana</i> sp.	<i>Eristalis interrupta, E. pseudorupium, E. rossica, Helophilus hybridus, H. parallelus</i>
сем. Primulaceae	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	<i>Helophilus hybridus</i>
сем. Limoniaceae	
<i>Limonium gmelinii</i>	<i>Didea intermedia, Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, Eristalinus sepulchralis, Lathyrophthalma aeneus, Eristalis anthophorina, E. arbustorum, E. intricaria, E. interrupta, E. rupium, E. tenax, Helophilus hybridus, H. parallelus, H. pendulus, Syritta pipiens</i>
сем. Oleaceae	
<i>Syringa vulgaris</i>	<i>Eristalis arbustorum, E. interrupta</i>
сем. Convolvulaceae	
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Sphaerophoria scripta, Syrphus ribesii, Chrysotoxum festivum, Helophilus hybridus</i>
сем. Boraginaceae	
<i>Myosotis imitata</i>	<i>Eupeodes nitens, Sphaerophoria chongjini, Sph. scripta, Platycerius albimanus, Cheilosia cynocephala, Ch. pagana, Helophilus hybridus, Syritta pipiens</i>
сем. Lamiaceae	
<i>Lycopus exaltatus, Mentha arvensis</i>	<i>Syritta pipiens Sphaerophoria scripta, Syritta pipiens</i>
сем. Scrophulariaceae	
<i>Veronica chamaedrys</i>	<i>Sphaerophoria menthastris, Sph. scripta, Helophilus hybridus, H. pendulus</i>
<i>V. spicata</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
сем. Plantaginaceae	
<i>Plantago intermedia</i>	<i>Dasysyrphus venustus, Syrphus ribesii, Sphaerophoria scripta, Chrysotoxum festivum, Eristalis pseudorupium, Helophilus pendulus, Parhelophilus versicolor</i>
<i>P. salsa</i>	<i>Platycerius sp.</i>
<i>P. urvillei</i>	<i>Chrysotoxum festivum, Helophilus hybridus, Eristalis rossica, E. pseudorupium</i>
сем. Rubiaceae	
<i>Gallium xpseudorubroides</i>	<i>Sphaerophoria scripta, Anasimyia interpuncta, Helophilus hybridus</i>
<i>G. ruthenicum</i>	<i>Sphaerophoria scripta, Cheilosia mutabilis</i>

Таблица 5. (продолжение).  
Table 5. (continuation).

Семейство/вид растения	Вид журчалки
сем. Caprifoliaceae	
<i>Lonicera tatarica</i>	<i>Dasysyrphus lunulatus</i> , <i>D. tricinctus</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Didea alneti</i> , <i>Scaeva selenitica</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>Pipiza bimaculata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i>
сем. Asteraceae	
<i>Achillea millefolium</i>	<i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Volucella inanis</i> , <i>V. pellucens</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Eristalis rossica</i> , <i>Spilomyia diophtalma</i>
<i>Cichorium intybus</i>	<i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus pendulus</i>
<i>Cirsium canum</i>	<i>Volucella bombylans</i> , <i>Helophilus pendulus</i> , <i>Eristalis arbustorum</i>
<i>C. esculentum</i>	<i>Episyphus balteatus</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Spilomyia diophtalma</i>
<i>C. setosum</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Volucella pellucens</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i>
<i>Crepis tectorum</i>	<i>Platycheirus albimanus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus hybridus</i>
<i>Galatella biflora</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i>
<i>G. angustissima</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i>
<i>Hieracium umbellatum</i>	<i>Eupeodes corolle</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i>
<i>Inula britannica</i>	<i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>I. hirta</i>	<i>Helophilus pendulus</i> , <i>Eristalis interrupta</i>
<i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Leucanthemum vulgare</i>	<i>Dasysyrphus lunulatus</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Cheilosia latifrons</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> <i>Cheilosia vernalis</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i>
<i>Ptarmica cartilaginea</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Senecio jacobaea</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>Serratula coronata</i>	<i>Episyphus balteatus</i>
<i>Scorzonera purpurea</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>Solidago canadensis</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>S. virgaurea</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Helophilus hybridus</i>
<i>Sochus arvensis</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Dasysyrphus tricinctus</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Epistrophe grossularia</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. rupium</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>N. tenur</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Tanacetum millefolium</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>Taraxacum bessarabicum</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i>
<i>T. officinale</i>	<i>Dasysyrphus arcuatus</i> , <i>D. lunulatus</i> , <i>D. nigricornis</i> , <i>D. tricinctus</i> , <i>D. venustus</i> , <i>Epistrophe euchroma</i> , <i>E. nitidicollis</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. flaviceps</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>E. latilunulatus</i> , <i>E. lundbecki</i> , <i>E. luniger</i> , <i>E. nitens</i> , <i>Parasyrus nigrifrons</i> , <i>Scaeva selenitica</i> , <i>Sphaerophoria chongjini</i> , <i>Sph. scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Melanostoma scalare</i> , <i>Platycheirus albimanus</i> , <i>P. ambiguus</i> , <i>P. angustatus</i> , <i>P. peltatus</i> , <i>Pipiza bimaculata</i> , <i>P. dubia</i> , <i>P. festiva</i> , <i>P. nocticula</i> , <i>Pipizella viduata</i> , <i>Cheilosia albifarsis</i> , <i>Ch. carbonaria</i> , <i>Ch. chloris</i> , <i>Ch. flavipes</i> , <i>Ch. gigantea</i> , <i>Ch. impressa</i> , <i>Ch. kuznetzovae</i> , <i>Ch. laisiopa</i> , <i>Ch. latifrons</i> , <i>Ch. nebulosa</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. praecox</i> , <i>Ch. proxima</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Neoascia tenur</i> , <i>Eumerus sogdianus</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. alpina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>E. oestraceus</i> , <i>E. rossica</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>A. transfuga</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Parhelophilus versicolor</i> , <i>Syritta pipiens</i> , <i>Chalcosyrphus nemorum</i>
<i>Tephroseris palustris</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Cheilosia vulpina</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. alpina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>Parhelophilus versicolor</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Tragopodon podolicus</i>	<i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus vitripennis</i> , <i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. intricaria</i> , <i>Helophilus parallelus</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	<i>Melanostoma scalare</i> , <i>Dasysyrphus tricinctus</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>S. torvus</i> , <i>S. vitripennis</i> , <i>Sphaerophoria rueppeli</i> , <i>Sph. scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Paragus quadrimaculatus</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. pseudorupium</i> , <i>E. tenax</i> , <i>Anasimyia transfuga</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Parhelophilus consimilis</i> , <i>P. versicolor</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Tripolium pannonicum</i>	<i>Chrysotoxum festivum</i> , <i>Episyphus balteatus</i> , <i>Eupeodes corolle</i> , <i>E. latifasciatus</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Sph. taeniata</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Volucella pellucens</i> , <i>Anasimyia lineata</i> , <i>Helophilus hybridus</i> , <i>H. parallelus</i> , <i>H. pendulus</i> , <i>Parhelophilus consimilis</i> , <i>Eristalinus sepulchralis</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. anthophorina</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>E. interrupta</i> , <i>E. rupium</i> , <i>Neoascia aenea</i> , <i>Myathropa florea</i> , <i>Syritta pipiens</i>
<i>Tussilago farfara</i>	<i>Eupeodes lundbecki</i> , <i>Sphaerophoria scripta</i> , <i>Syrphus ribesii</i> , <i>Platycheirus ambiguus</i> , <i>Cheilosia albipila</i> , <i>Ch. chloris</i> , <i>Ch. cynocephala</i> , <i>Ch. flavipes</i> , <i>Ch. fraterma</i> , <i>Ch. pagana</i> , <i>Ch. pubera</i> , <i>Ch. reniformis</i> , <i>Ch. vernalis</i> , <i>Lathyrophthalma aeneus</i> , <i>Eristalis abusiva</i> , <i>E. arbustorum</i> , <i>Anasimyia interpuncta</i> , <i>Helophilus parallelus</i>

Лаврова обнаружили в большом количестве в кишечнике именно этих эристалин. Кроме того, у *E. interrupta* её оказалось значительно больше, чем у *E. arbustorum*. В наших учётах на всех розоцветных *E. interrupta* был более многочисленным, чем *E. arbustorum*. В кишечнике *Helophilus pendulus* Длусским и Лавровой обнаружено значительное количество пыльцы герани болотной (*Geranium palustre*). В наших исследованиях на этом растении проведено мало учётов, тем не менее, *Helophilus pendulus* посещал цветки данного растения. Ссиманк также отметил, что журчалки этого вида преимущественно посещали цветки герани болотной [Ssymank, 2002а].

Одной из гипотез, объясняющих причины пищевого предпочтения, как уже отмечалось выше, является окраска цветков. Хэслетт проводил опыты с раскрашенными дисками, которые заменяли цветки [Haslett, 1989]. В этих опытах *Eristalis pertinax* выбирал жёлтые диски, однако в его кишечнике преобладала пыльца растений с белыми цветками. Длусский и Лаврова также отметили для этого вида преобладание пыльцы растений с белыми цветками в содержимом кишечника [Длусский, Лаврова, 2001]. Предпочтение журчалками рода *Eristalis* растений с белыми цветками отмечал Мутин для Дальнего Востока [Мутин, 1985]. В наших исследованиях сирфиды этого рода одинаково посещали растения с жёлтыми, и с белыми цветками. В условиях Южного Зауралья наибольшее количество видов эристалин было встречено на растениях с жёлтыми цветками — гульянке Лезеля, молочае прутьевидном, калужнице болотной, одуванчике лекарственном (табл. 5). Багачанова [1990] указала, что в Центральной Якутии некоторые широко распространённые и массово цветущие растения с жёлтыми, белыми и фиолетовыми цветками (например, *Dasiforia fruticosa*, *Galium boreale*, *Geranium pratense*) сирфидами отвергались. Все названные авторы указывали на то, что мухи-журчалки в целом предпочитают растения с белыми и жёлтыми цветками. Следует отметить, что растения с жёлтыми и белыми цветками преобладают, по крайней мере в изученных регионах, над растениями с другой окраской. Так, из приведённых данных Багачановой [1990] для Центральной Якутии среди всех растений, на которых питались мухи-журчалки, с жёлтыми цветками было 36 видов, с белыми — 38, с розово-пурпурными — 9, с синими и фиолетовыми — 6. В Южном Зауралье из 120 видов кормовых растений с фиолетово-синей и розово-красной окраской цветков было всего 22 вида. Растения с сине-фиолетовыми и розово-красными цветками в исследованиях многих авторов [Haslett, 1989; Gilbert, 1981; Мутин, 1985; Длусский, Лаврова, 2001] посещали журчалки рода *Rhingia*. Все растения с цветками этой окраски имеют сложно устроенный узкий венчик, некоторый из которого можно достать только насекомым с длинным хоботком, каковым и обладают *Rhingia*.

## Выводы

1. В условиях Южного Зауралья было установлено 120 видов из 26 семейств кормовых растений для 169 видов из 48 родов мух-журчалок.

2. Самыми предпочтаемыми для журчалок оказались представители семейств (в порядке уменьшения отмеченных на них видов журчалок): Rosaceae, Apiaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae, Brassicaceae, Salicaceae и Alismataceae. Между ними обнаружено наибольшее сходство среди всех семейств как по посещаемым их видам, так и по родам журчалок.

3. Наибольшее сходство между этими семействами оказалось в парах Rosaceae – Brassicaceae и Alismataceae – Ranunculaceae.

4. Наиболее привлекательными для сирфид оказались, в порядке уменьшения количества посещающих их видов *Taraxacum officinale* (Asteraceae), *Euphorbia virgata* (Euphorbiaceae), *Spiraea crenata* (Rosaceae), *Heracleum sibiricum* (Apiaceae), *Caltha palustris* (Ranunculaceae), *Cenolophium denudatum* (Apiaceae), *Cerasus vulgaris* (Rosaceae), *Sisymbrium loeselii* (Brassicaceae), *Seseli libanotis* (Apiaceae), *Alisma plantago-aquatica* (Alismataceae).

5. Наиболее высокое сходство по видовому составу журчалок отмечено между *Cenolophium denudatum* и *Tripolium pannonicum*, *Taraxacum officinale* и *Ranunculus polyanthemos*, *Euphorbia virgata* и *Filipendula vulgaris*, *Seseli libanotis* и *Tripleurospermum inodorum*, *Heracleum sibiricum* и *Kadenia dubia*, *Caltha palustris* и *Salix triandra*.

6. Наибольшее сходство растений по обилию посещающих их сирфид оказалось между *Tripleurospermum inodorum* и *Tripolium pannonicum*, *Seseli libanotis* и *Pastinaca sylvestris*, *Sonchus arvensis* и *Cenolophium denudatum*, *Sisymbrium loeselii* и *Euphorbia virgata*, *Taraxacum officinale* и *Spiraea crenata*.

7. Больше всего видов журчалок зарегистрировано на *Taraxacum officinale* (68 видов из 23 родов), а максимальная численность всех сирфид зафиксирована на *Tripolium pannonicum* (239,7 экз./учёт).

8. Для 12 видов журчалок кормовыми растениями оказались только представители семейства Apiaceae, ввиду чего эти виды сирфид отнесены к олигофагам. 118 видов журчалок оказались полифагами. Остальные 39 видов были отмечены лишь на одном виде растений.

9. 22 вида журчалок посещали более 20 видов растений: *Dasyphorus venustus*, *Episyphus balteatus*, *Eupeodes corollae*, *Sphaerophoria scripta*, *Syrphus ribesii*, *S. vitripennis*, *Chrysotoxum festivum*, *Melanostoma scalare*, *Eristalinus sepulchralis*, *Eristalis abusiva*, *E. anthophorina*, *E. arbustorum*, *E. intricaria*, *E. interrupta*, *E. pseudorupium*, *Anasymyia interpuncta*, *Helophilus hybridus*, *H. parallelus*, *H. pendulus*, *Syritta pipiens*, *Myathropa florea*. Больше всего растений в кормовой базе было у *Sphaerophoria scripta* (75 видов, 19 семейств).

10. На примере семейства сирфид были подтверждены следующие причины сходства между растениями по посещавшим их видам журчалок:

- перекрывание сроков цветения видов растений;
- произрастание растений в сходных биотопах;
- таксономическое сходство видов растений;
- продолжительность лёта некоторых видов мух-журчалок.

11. Окраска и форма венчика цветков играет не-значительную роль в предпочтении журчалками тех или иных видов растений.

## Благодарности

Автор выражает искреннюю признательность Н.И. Науменко за определение растений, А.В. Баркалову за ценные замечания и предложения, Р.Ю. Дудко за помощь в статистической обработке материала, В.А. Бурлаку за обсуждение работы.

## Литература

- Багачанова А.К. 1990. Фауна и экология мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Якутии. Якутск. 164 с.
- Баркалов А.В., Бурлак В.А. 2000. Характер антофилии у мух-журчалок рода *Cheilosia* Mg. (Diptera, Syrphidae) // Сибирский экологический журнал. Т.7. Вып.4. С.395–408.
- Гринфельд Э.К. 1955. Питание журчалок (Diptera, Syrphidae) и их роль в опылении // Энтомологическое обозрение. Т.34. №.1. С.164–166.
- Гринфельд Э.К. 1962. Происхождение антофилии у насекомых. Л. Изд-во ЛГУ. 186 с.
- Грицкевич Д.И. 1998. Экология мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) Нижнего Приамурья. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Новосибирск. 18 с.
- Длусский Г.М., Лаврова Н.В. 2001. Сравнение имагинального питания некоторых видов журчалок (Diptera, Syrphidae) // Журнал общей биологии Т.62. №.1. С.57–65.
- Мутин В.А. 1983а. Видовой состав и экология мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) — опылителей некоторых цветковых растений Нижнего Приамурья // Систематика и эколого-фаунистический обзор отдельных отрядов насекомых Дальнего Востока. С.86–109.
- Мутин В.А. 1983б. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) в антофильных комплексах Южного Приморья // Систематика и эколого-фаунистический обзор отдельных отрядов насекомых Дальнего Востока. С.100–109.
- Мутин В.А. 1985. Фауна и экология мух-журчалок (Diptera, Syrphidae) юга Дальнего Востока. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Владивосток. 20 с.
- Мутин В.А. 1987а. Мухи-журчалки (Diptera, Syrphidae) в антофильном комплексе калужницы перепончатой // Экология и география членистоногих Сибири. Новосибирск. С.80–82.
- Мутин В.А. 1987б. Трофические связи имаго сирфид (Diptera, Syrphidae) с цветковыми растениями // Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. Ленинград. С.77–79.
- Песенко Ю.А. 1972. К методике количественных учётов насекомых-опылителей. Экология. Вып.1. С.89–95.
- Песенко Ю.А. 1982. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва. Наука. 287 с.
- Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. Мир и семья–95. 990 с.
- Gilbert F. 1981. Foraging ecology of hoverflies: morphology of their mouthparts in relation to feeding on nectar and pollen in some common urban species // Ecol. Entomol. Vol.6. P.245–262.
- Gilbert F. 1985. Ecomorphological relationship in hoverflies (Diptera, Syrphidae) // Proc. R. Soc. London. Vol.224. P.91–105.
- Haslett J.R. 1989. Interpreting patterns of resource utilization: randomness and selectivity in pollen feeding by adult hoverflies // Oecologia. Vol.78. P.433–442.
- Holloway B. 1976. Pollen-feeding in hover-flies (Diptera, Syrphidae) // Journal of Zoology. Vol.3. No.2. P.339–350.
- Keilbach R. 1954. Goldaugen, Schwebfliegen und Marienkäfer // Die Neue Brehm – Bücherei. 63 S.
- Leereveld H., Meeuse A., Stelleman P. 1976. Anthecological Relations between reputedly anemophilous flowers and Syrphid flies. II. *Plantago media* L. // Acta Bot. Neerl. Vol.25. No.3. P.205–211.
- Malec F. 1986. Die Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) der Umgebung Kassels // Philippia. Vol.4. P.346–379.
- Radisic P., Vujic A., Simic S., Radenkovic S. 1999. Pollen transport of species *Cheilosia albipila* Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) // Acta Entomologica Serbica. Beograd. Vol.3. Nos 1–2. P.77–84.
- Radisic P., Vujic A., Simic S. 2001a. Pollen transport of species *Cheilosia brunniipennis* Becker, 1894 (Diptera, Syrphidae) // Acta Entomologica Serbica. Beograd. Vol. 4. Nos 1–2. P.75–82.
- Radisic P., Vujic A., Simic S. 2001b. Pollen transport of species *Cheilosia flavipes* (Panzer, 1798) (Diptera, Syrphidae) // Acta Entomologica Serbica. Beograd. Vol. 4. Nos 1–2. P.83–91.
- Reemer M. 1999. Faunistiek en ecologie van het Zweefvliegen genus *Epistrophe* in Nederland (Diptera, Syrphidae) // Nederlandse Faunistische Mededelingen. Vol.8. P.33–65.
- Stelleman P., Meeuse A. 1976. Anthecological relations between reputedly anemophilous flowers and Syrphid flies. I. The possible of Syrphid flies as pollinators of *Plantago* // Tijdschrift voor Entomologie. deel. Vol.119. Afl.2. P.15–31.
- Ssymank A. 2001. Vegetation und blütenbesuchende Insekten in der Kulturlandschaft. Pflanzengesellschaften, Blühphänologie, Biotopbindung und Raumnutzung von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) im Drachenfelser Ländchen sowie Methodenoptimierung und Landschaftsbewertung. Tierwelt in der Zivilisationslandschaft (Teil V) // Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg. Vol.64. P.1–513.
- Ssymank A. 2002a. Patterns of habitat use by Syrphidae (Diptera) in the valley of the river Strom in north-east Brandenburg // Volucella. Stuttgart. Vol.6. P.81–124.
- Ssymank A. 2002b. Vom Karwendel bis zur Donau — Dipterologische Notizen von der Isar. Beiträge zur Faunistik und Biologie der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in Bayern, Teil II // Volucella. Stuttgart. Vol.6. P.175–193.